

Orthogonius apicalis Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, [1904], p. 429. — Cette espèce n'a aucun rapport avec les Orthogoniens; c'est un Coptodéride du genre *Nycteis* Lap.-Cast. et du groupe de *N. brevicollis* Lap.-Cast., mais avec le pronotum encore plus transversal, la tache jaune apicale plus près de l'apex, etc.

Colpodes validus Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, [1904], p. 429 = *Microchila picea* Brullé (1834). — La place du genre *Microchila* Br. n'est pas encore définitivement fixée. BRULLÉ l'avait, à mon avis, bien placé dans les Féronides dont il est incontestablement voisin, quoique présentant des caractères extrêmement spéciaux. LACORDAIRE l'a mis en tête de ses Trigonotomides (qui ne sont qu'une section des Féronides), mais il a commis une erreur matérielle grave en disant (*Gen. Col.*, I, p. 310) que *Microchila* a le dernier article des palpes « maxillaires » sécuriforme — il faut lire « labiaux ». CHAUDOIR (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XI [1868], p. 451) a avancé que c'était un Orthogonien, opinion difficile à admettre et que j'ai peut-être eu tort d'enregistrer sans contrôle dans ma « Liste des Coléopt. de la région malgache », p. 29.

Description d'un *Acilius* nouveau de Chine

[COL. DYTISCIDAE]

par R. PESCHET.

Acilius sinensis, n. sp. — *Ovalis, latus, modice convexus, parum nitidus, crebre punctatus, supra rufo-testaceus, capite in vertice nigro, prothorace in medio ante basin anguste et transverse nigro, scutello nigro, elytris vix nigro-irroratis, ante apicem fascia lata transversa nigra; epipleuris flavis. Palpis, antennis pedibusque rufis, tarsis posterioribus rufo-piceis, robustis. Subtus niger, prosterno, coxarum processu abdomineque rufo-ferrugineis. Tarsorum posteriorum marginibus posterioribus longe ciliatis.* — Long. 48 mm.; lat. 10,6 mm.

♂ *Modice nitidus, corpore crebre punctato, tarsorum anteriorum et intermediorum unguiculis aequalibus, simplicibus*

♀ *Nitidus, prothorace medio utriusque versus latera vix impresso, elytris sulcis quatuor villosis, integris.*

Types : 1 ♂, 1 ♀. — Chine : province de Se-Tshuan.

De la taille des grands individus d'*A. sulcatus* L., mais bien différent par sa coloration, sa ponctuation, la forme de ses tarses postérieurs.

Dessus entièrement roux testacé ferrugineux, à peine irroré de

noir chez le mâle, plus distinctement chez la femelle. Vertex noir; pronotum maculé, dans son tiers médian, d'une bande noire longitudinale étroite, en accolade, entière chez le mâle, interrompue en son milieu chez la femelle. Élytres marqués, sur leur quart postérieur, d'une fascie noire large, ondulée, légèrement oblique, à contours bien délimités, n'atteignant ni la suture, ni le bord marginal. Scutellum noir.

Ponctuation de la tête simple, dense et très fine, accompagnée sur le vertex, chez le mâle, de points plus forts et espacés; celle du pronotum double, assez espacée chez la femelle, plus forte et plus dense chez le mâle, sur fond finement et densément pointillé, non réticulé. Ponctuation des élytres, chez le mâle, simple et sur fond lisse assez brillant, espacée à l'extrême base et surtout dans les régions scutellaire et suturale, beaucoup plus dense sur le disque, les régions marginale et apicale; celle de la femelle, sur fond très finement pointillé et brillant, réduite, en dehors des sillons, où elle est rugueuse et pilifère, à quelques points disséminés à l'extrême base, alignés dans la région suturale, sur les côtés et le bord marginal.

Dessous noir, assez brillant, non réticulé ni chagriné; prosternum, épipleures, pattes antérieures et intermédiaires, palpes et antennes roux flave, abdomen et pattes postérieures en entier, ailes métasternales et apophyses coxales en partie, d'un roux ferrugineux plus ou moins foncé. Tarses postérieurs roux brun, courts, robustes; frange terminale de leurs articles, à la face supérieure et surtout à la face inférieure, formée de poils longs, atteignant presque la moitié de l'article tarsal suivant.

Ponctuation forte et dense sur les hanches postérieures et les ailes métasternales, sauf dans la région médiane; celle de l'abdomen assez forte sur les deux premiers segments, plus fine sur les suivants, leurs bords latéraux finement striolés. Face inférieure des cuisses postérieures finement et éparsement ponctuée.

♀ Sillons élytraux sensiblement d'égale longueur, les 2^e et 3^e larges, les 1^{er} et 4^e plus étroits, ce dernier sinueux, élargi en son milieu. En dehors de ce sillon, entre la côte qui le limite et le bord marginal explané de l'élytre, existe un rudiment de 5^e sillon, très abrégé en avant, très étroit, visiblement vilieux. Pronotum présentant sur les côtés une dépression à peine sensible, où la ponctuation est un peu condensée, sans paraître pilifère, comme chez la femelle d'*A. sulcatus* L.

L'unique couple de cette espèce est en assez mauvais état; les sillons élytraux, chez la femelle, paraissent glabres à première vue: cà et là subsistent quelques poils qui très certainement, chez les individus frais, doivent recouvrir entièrement ces sillons, aussi ai-je décrit ceux-

ci comme villex. N'ayant pu, par contre, trouver trace de pubescence sur les impressions prothoraciques, il conviendra d'attendre l'examen de nouveaux spécimens femelles pour préciser la description sur ce point. Chez le mâle, les tarses intermédiaires, garnis de touffes de poils sur leur bord interne, sont dépourvus cependant de cupules au bord externe de leur face inférieure : il est à présumer, en raison des affinités de l'*A. sinensis* avec l'*A. sulcatus* L., que ces cupules doivent exister chez les individus en bon état.

J'ai acquis cette espèce nouvelle de notre collègue M. DONCKIER DE DONCEEL.

Description de deux espèces nouvelles de *Scaphidiidae* [Col.]

par Julien ACHARD.

Scaphidium latissimum, n. sp. — Ovale, large, assez peu convexe. Roux avec la massue des antennes noire, une grande tache noire mal limitée couvrant en partie le disque et une tache d'un testacé clair dans chaque angle du pronotum, une grande tache noire couvrant les élytres et ne laissant subsister la couleur foncière rousse que sur le calus huméral, les marges latérales, les épipléures et le sommet. Dessous roux, avec les pièces métasternales plus ou moins enfumées. Pattes rousses avec les fémurs annelés de testacé clair près de leur base et près de leur sommet.

Tête imperceptiblement pointillée; front peu étroit et presque plan; épistome tronqué carrément en avant. Prothorax grand, peu convexe, fortement abaissé vers l'avant, bords latéraux rétrécis assez fortement et presque en ligne droite de la base au sommet, ponctuation forte et dense, emplacement de la strie arquée marqué seulement par de gros points aciculés disposés latéralement en double rangée. Élytres courts, peu convexes, arrondis latéralement, convertis d'une grosse ponctuation très dense et inordinée; strie suturale entière mais très fine, marquée de points espacés; strie transversale incomplète et marquée de gros points enfoncés qui se continuent jusqu'au calus huméral. Pattes longues et grêles, avec tous les tibias nettement arqués. — Long. 6 mm.

HAB. Madagascar : Tananarive.

Scaphidium quadriplagatum, n. sp. — Oblong, assez large. Tête rousse, avec le front très resserré entre les yeux. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, rousses avec les cinq articles de la massue noirs. Prothorax convexe, assez allongé, régu-